

Spolno prenosive bolesti

To je velika skupina upala koje se prenose spolnim odnosom i kontaktom s jednog na drugog partnera. Učestalost spolno prenosivih bolesti (STD - sexually transmitted diseases) u stalnom je porastu. Posebno su česte u mladih ljudi, u doba kada se češće mijenjaju spolni partneri.

Zašto su spolno prenosive bolesti od velikog zdravstvenog značaja?

Zbog:

- ❖ akutnih zdravstvenih problema
- ❖ povezanosti s premalignim bolestima
- ❖ povezanosti sa zdjeličnim upalama
- ❖ povezanosti s neplodnošću i nemogućnosti zanošenja
- ❖ povezanosti s oštećenjem jajovoda i izvanmaterničnom trudnoćom
- ❖ mogućih poremećaja u trudnoći, porođaju i babinju
- ❖ mogućeg izazivanja upale u novorođenčeta
- ❖ mogućih težih zdravstvenih tegoba, od kojih neke mogu prouzročiti i smrtni ishod.

Koje su važne spoznaje?

Već pri prvom kontaktu žene se lakše i češće zaraze od muškaraca. Isto tako, bolest ima ozbiljniji tijek i posljedice kod žena, dok je u muškarca bolest češće asimptomatska, odnosno bez simptoma ili kao tiha infekcija.

Kako se bolest manifestira u žena?

Može doći do upale rodnice (kolpitis i vaginitis), upale vulve (vulvitis), upale vrata maternice (cervicitis), upale sluznice maternice (endometritis), kao i upala jajovoda i jajnika (salpingitis, adneksitis). Kao posljedica tih upala, odnosno prelaska uzročnika u trbušnu šupljnu, može nastati peritonitis (upala potrbušnice) i pelveoperitonitis, a što su upale opasne po život.

Koji su uzročnici?

- ❖ gonoreja (*Neisseria gonorrhoeae*)
- ❖ klamidija (*Chlamydia trachomatis*)

- ❖ sifilis (*Treponema pallidum*)
- ❖ vaginitisi (*Gardnerella vaginalis*)
- ❖ streptokokne upale (*Streptococcus B*)
- ❖ mikoplazme (*Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum*)
- ❖ kondilomi (*HPV - humani papiloma virus*)
- ❖ HIV-bolest (*HIV - virus humane imunodeficijencije*)
- ❖ citomegalovirus (*CMV*)
- ❖ hepatitis (*HBV - hepatitis B virus*)
- ❖ herpes genitalis (*HSV - herpes simplex virus*)
- ❖ molusca contagiosa (poksvirusi)
- ❖ kandidijaza (*Candida albicans*)
- ❖ skabijes (*Sarcoptes scabiei*)
- ❖ pediculus pubis (*Phthirus pubis*).

Neke se spolne bolesti prenose i drugim načinima i vidovima zaraze, a što vrijedi za virusne bolesti hepatitis B, HIV i CMS.

Važno!

U svih slučajevima i oblicima spolno prenosivih bolesti **uvijek treba istodobno liječiti oba partnera**, a ne samo ženu!

Kakav je značaj spolno prenosivih bolesti u trudnoći?

Imaju poseban značaj u trudnoći, jer mogu uzrokovati upale u novorođenčeta. Neke od njih su, dapače, povezane s pobačajem, upalom posteljice i plodovih ovoja, prijevremenim prsnućem plodovih ovoja, zatim prijevremenim trudovima i prijevremenim rođenjem te zastojem u rastu i razvoju djeteta.