

Vaginalne infekcije

Kakav je normalan vaginalni iscijedak i od čega se sastoji?

Normalan vaginalni iscijedak sastoji se od vode, sluzi iz cerviksa (vrata maternice), odbačenih epitelnih stanica vagine, postojeće bakterijske flore, elektrolita i drugih kemijskih sastojaka. Oskudan je u predpubertetu i postmenopauzi. Obilniji je u generativnoj dobi žene. Podložan je promjenama ovisno o hormonskom statusu žene (faze menstruacijskog ciklusa). Normalan iscijedak je bijel, visoke viskoznosti, pahuljičast i bez mirisa. Normalni uvjeti u rodnici sačuvani su složenim mehanizmom održavanja pH kiselim koji je između 3,8 do 4,2.

Kako se stvara prirodna kiselost rodnice?

Estrogeni hormoni potiču stvaranje glikogena u epitelu rodnice. Uz laktobacile, enzime i druge bakterije, glikogen se metabolizira u mlijeko kiselinu. Time se postiže kiseli pH (oko 4) kojim se obuzdavaju potencijalno patogene bakterije i protozoi. Normalan ekosustav rodnice održava Lactobacillus acidophilus (Doderleinovi štapići). To su aerobi koji se nalaze u 70 do 90 % žena bez upale. Važno je da budu u dovoljnoj koncentraciji.

Koliko mikroorganizama živi u rodnici?

U normalnoj rodnici bez upale ima 17 do 30 vrsta različitih bakterija, dijelimo ih na aerobe i anerobe. Od aeroba su prisutni Lactobacillus, Difteroidi, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Enterococcus Faecalis, Beta-H streptococcus, D-Streptococcus, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas aeruginosa. Od anaeroba su prisutni Peptococcus, Peptostreptococcus, Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Eubacterium i Veillonella. Rodynica, dakle, nije sterilna sredina već sadrži mnoštvo mikroorganizama koji međusobno obitavaju u ravnoteži. Stoga će vaginitis izazvati visoka koncentracija patogenih uzročnika koji su naišli na slabu obranu, odnosno povišen pH rodnice. To se vidi i po izgledu vaginalnog iscjetka. Ako je obilan, u grudicama, žut, pjenušast i neugodna mirisa, riječ o upali rodnice.